

# Листок-вкладыш – информация для пациента

## Смектит Канон, 3 г, паста для приема внутрь

Действующее вещество: смектит диоктаэдрический

**Перед приемом препарата полностью прочтите данный листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки, или медицинской сестры. Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

### Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Смектит Канон, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Смектит Канон.
3. Прием препарата Смектит Канон.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Смектит Канон.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### 1. Что из себя представляет препарат Смектит Канон, и для чего его применяют

Препарат Смектит Канон содержит действующее вещество смектит диоктаэдрический, относящийся к группе средств, применяемых для лечения жидкого стула (диареи).

#### Показания для применения

Препарат Смектит Канон показан к применению у взрослых и детей в возрасте старше 2 лет.

- Лечение острой диареи у детей старше 2 лет в дополнении к лечению обезвоживания (регидратации) и у взрослых.
- Симптоматическое лечение хронической (функциональной) диареи у взрослых.
- Симптоматическое лечение боли, связанной с функциональными заболеваниями кишечника, у взрослых.

#### Способ действия препарата Смектит Канон

Смектит диоктаэдрический представляет собой природное соединение, которое оказывает свое действие в кишечнике, не всасываясь в организм. В просвете кишечника это вещество способно поглощать бактерии, вирусы и различные токсины, предотвращая их вредное воздействие. Смектит диоктаэдрический благодаря своей вязкости также способен обволакивать стенки кишечника, стабилизировать собственную защитную кишечную слизь и оказывать защищающее действие от раздражителей. В результате Вам становится легче.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

### 2. О чем следует знать перед приемом препарата Смектит Канон

#### Противопоказания

**Не принимайте препарат Смектит Канон:**

- если у Вас аллергия на смектит диоктаэдрический или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

#### Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Смектит Канон проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником

аптеки, или медицинской сестрой.

Если у Вас есть или когда-либо был длительный (хронический) запор, поговорите с лечащим врачом перед началом приема, а далее соблюдайте осторожность при приеме препарата Смектит Канон.

Детям вместе с приемом препарата Смектит Канон необходимо также принимать лечение для предотвращения обезвоживания организма. Взрослым также необходимо это лечение, но в некоторых случаях его разрешается не проводить. Количество препарата, требуемого для предупреждения обезвоживания зависит от тяжести диареи, возраста и состояния пациента. При сильной или длительно текущей диарее необходимо обратиться за медицинской помощью.

Во время диареи необходимо:

– восполнять потерю жидкости путем потребления большого количества солевых или сладких жидкостей. Потребность в жидкости для взрослого составляет 2 литра в сутки;

– соблюдать диету с исключением некоторых продуктов, особенно сырых фруктов, зеленых овощей, пряных блюд, а также замороженных продуктов и напитков. Стоит отдать предпочтение мясу, приготовленному на гриле, и рису.

#### Дети и подростки

Не давайте препарат детям младше 2 лет, поскольку эффективность и безопасность не установлены.

#### Другие препараты и препарат Смектит Канон

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Не принимайте препарат Смектит Канон одновременно с какими-либо другими препаратами. Препарат Смектит Канон может связывать другие препараты в кишечнике, тем самым снижая их эффективность.

#### Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Не принимайте препарат Смектит Канон во время беременности и грудного вскармливания.

#### Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат не влияет или незначительно влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами. Убедитесь, что Вы знаете, как Вы реагируете на препарат, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.

### 3. Прием препарата Смектит Канон

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### Рекомендуемая доза:

– Для лечения острой диареи рекомендуемая доза для взрослых составляет – 3 пакетика в сутки в течение 7 дней. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения.

– Для применения при других показаниях рекомендуемая доза для взрослых составляет – в среднем, 3 пакетика в сутки.

## Применение у детей и подростков

Для лечения острой диареи у детей старше 2 лет рекомендуемая доза составляет – 2 пакетика в сутки. Суточная доза может быть удвоена в начале лечения.

## Путь и (или) способ введения

Внутрь.

Перед открытием пакетика с пастой его необходимо размять между пальцами, доведя его содержимое до жидкого состояния.

Вы можете проглотить содержимое пакетика неразведенным, или смешать с небольшим количеством воды перед приемом.

Препарат Сметит Канон принимайте между приемами пищи.

Если препарат предполагается принимать ребенку, то Вы можете содержимое пакетика предварительно растворить в детской бутылочке или перемешать с каким-либо полужидким продуктом (каша, пюре, компот, детское питание).

## Если Вы приняли препарата Сметит Канон больше, чем следовало

Передозировка препаратом может вызвать выраженный запор или образование в желудке или кишечнике твердого комка из препарата (безоара).

## Если Вы забыли принять препарат Сметит Канон

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

## 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

## Прекратите прием препарата Сметит Канон и немедленно обратитесь за медицинской помощью,

в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции, которая наблюдалась с неизвестной частотой (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- затрудненное дыхание или глотание;
- головокружение;
- отек лица, губ, языка или горла;
- сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей.

## Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Сметит Канон.

*Часто (могут возникнуть не более чем у 1 человека из 10):*

- запор.

*Нечасто (могут возникнуть не более чем у 1 человека из 100):*

- рвота;
- сыпь.

*Редко (могут возникнуть не более чем у 1 человека из 1000):*

- крапивница.

*Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):*

- зуд.

## Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1

Тел.: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

## 5. Хранение препарата Сметит Канон

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке и на картонной пачке, после обозначения «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

## 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

### Препарат Сметит Канон содержит

Действующим веществом является смектит диоктаэдрический.

Каждый пакетик содержит 3 г смектита диоктаэдрического.

Прочими вспомогательными веществами являются: ароматизатор какао 04064, ароматизатор карамельный 19328, аскорбиновая кислота, калия сорбат, камедь ксантановая, лимонная кислота, су-к랄оза, вода очищенная.

### Внешний вид препарата Сметит Канон и содержимое упаковки

Паста для приема внутрь.

По 10,27 г пасты в пакетик из многослойного материала (полиэтилентерефталат/фольга алюминия-евая/полиэтилен).

По 6, 8, 10, 12 или 14 пакетиков вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

## Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково,

г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105

Тел.: +7 (495) 797-99-54

Электронная почта: [safety@canonpharma.ru](mailto:safety@canonpharma.ru)

**За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:**

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково,

г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105

Тел.: +7 (495) 797-99-54

Электронная почта: [safety@canonpharma.ru](mailto:safety@canonpharma.ru)

Получить дополнительные данные о препарате, сообщить о нежелательных лекарственных реакциях можно по телефону 8 (800) 700-59-99 (бесплатная линия 24 часа) или на сайте [www.canonpharma.ru](http://www.canonpharma.ru) в разделе «Политика в области качества» – «Безопасность препаратов».

Листок-вкладыш пересмотрен 06.12.2024

## Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://eec.eaeunion.org/>.